

หยุดการแพร่กระจายเชื้อโรค **เจลล้างมือ**

วิธีการใช้



1 เทผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ 2-3 มิลลิลิตร หรือพอประมาณ ใส่ลงในฝ่ามือกระจายเนื้อเจลใช้ฝ่ามือถูกัน

2 ใช้ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วชอกนิ้ว

3 กระจายเนื้อเจลใช้ฝ่ามือและนิ้วชอกนิ้วเล็บชอกเล็บและชอกนิ้วมือ



4 กระจายเนื้อเจลใช้หลังนิ้วถูฝ่ามือ

5 กระจายเนื้อเจลใช้ฝ่ามือถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบ

6 กระจายเนื้อเจลใช้ปลายนิ้วมือถูฝ่ามือ

7 ใช้ฝ่ามือถูรอบข้อมือ ปล่อยให้เจลจนแห้งไปเองโดยไม่ต้องล้างน้ำหรือใช้ผ้าเช็ดออก



ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลพระการพิชผล อยากรให้ผู้ใช้บริการสุขภาพดีปลอดภัยห่างไกลโรค

การทำมาความสะอาดพื้นผิวสัมผัส



แอลกอฮอล์ (> 70% Alcohol)

(พื้นผิวที่เป็นโลหะ) ผสมน้ำร้อน 70 องศา



ผงซักฟอก (Detergent)

เซลเซียส (สิ่งแฉดล้อม/วัสดุที่เป็นผ้า)



น้ำยาฆ่าเชื้อเดกตอล (4.8% Chloroxylenol)

2.5%
น้ำยา 1 : น้ำ 39 ส่วน (ซักผ้า/พื้นผิวทั่วไป)

5%
น้ำยา 1 : 70% Alc 19 ส่วน (เครื่องที่ใช้ในครัวเรือน)



น้ำยาฟอกขาว (5% Na hypochloride)

0.05%
น้ำยา 1 : น้ำ 99 ส่วน (พื้นผิวทั่วไป)

0.5%
น้ำยา 1 : น้ำ 9 ส่วน (พื้นผิวที่มีละอองเสมหะ สารคัดหลั่ง)



ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (3% H₂O₂) 1 : น้ำ 5 ส่วน (ระมัดระวังการกัดกร่อน)

ห้ามพ่นจะทำให้เกิดละอองลอย

อบจ.โตกจาก
รพ.๘๘.โตกน้อย